

**Zāļu vispārīgie nosaukumi/ medicīnas ierīces, kas paredzēti diagnožu grupas
"14. Nervu sistēmas slimības" ārstēšanai**

N.p.k.	Diagnozes grupa/ diagnoze	Diagnozes kods (SSK-10)	Komp. apmērs %	Zāļu vispārīgie nosaukumi/ medicīnas ierīces	Kompensācijas nosacījumi
1	2	3	4	5	6
14.1 Ekstrapiramidāli un kustību traucējumi					
1.	Parkinsona (<i>Parkinson</i>) slimība	G20	90	Amantadinum Bromocriptinum Levodopum/ Benserazidum Carbidopum/ Levodopum Selegilinum Trihexyphenidylum	
				Entacaponum Carbidopum/ Levodopum/ Entacaponum	Neirologa kompetencē pacientiem, kuri ir <i>Levodopum</i> preparātu atkarīgi un ar šo preparātu nepieciešamo devu izraisītiem sarežģījumiem.
				Pramipexolum Ropinirolum	Neirologa kompetencē darba aktīviem pacientiem ar slimības trīcošo formu, kuriem trīci nevar kompensēt ar citām KZS iekļautām zālēm.
14.2 Demielinizējošas CNS slimības					
2.	Multiplā skleroze	G35	100	Amantadinum Baclofenum	
				Methylprednisolonum	Injekciju formu izraksta LJMC Multiplās sklerozes centra neirologi.
				Oxybutyninum Pentoxifyllinum	
				Piracetamum	2 ārstēšanas kursi pa 3 mēnešiem gadā.
				Tizanidinum Tolperisonum	

1	2	3	4	5	6
				Interferonum beta-1a	Izraksta LJMC Multiplās sklerozes centra neirologi saskaņā ar Latvijas Neirologu biedrības Demielinizējošo slimību paneļa konsīlija slēdzienu pacientiem: 1) ar klīniski izolētiem multiplās sklerozes simptomiem, cerebrālu formu, 2) ar recidivējoši- remitējošu multiplo sklerozi, cerebrālu un cerebrovaskulāru formu, 3) ar celulārās imunitātes rādītāju aktivizēšanos, 4) ar mainīgām multiperēkļainām izmaiņām MR izmeklējumos bez smadzeņu atrofijas pazīmēm.
				Interferonum beta-1b	Izraksta LJMC Multiplās sklerozes centra neirologi saskaņā ar Latvijas Neirologu biedrības Demielinizējošo slimību paneļa konsīlija slēdzienu pacientiem: 1) ar recidivējoši- remitējošu vai sekundāri progresējošu multiplo sklerozi, cerebrālu, cerebrospinālu vai spinocerebrālu slimības formu, 2) ar multiperēkļainu CNS bojājumu gan galvas, gan muguras smadzenēs MR izmeklējumos, 3) ar ilgstoši aktivētiem celulārās imunitātes rādītājiem.
				Glatirameri acetatum	Izraksta LJMC Multiplās sklerozes centra neirologi saskaņā ar Latvijas Neirologu biedrības Demielinizējošo slimību paneļa konsīlija slēdzienu- 2.rindas imūnmodulējošs līdzeklis: 1) pacientiem ar recidivējoši-remitējošu multiplo sklerozi, cerebrālu un cerebrospinālu formu vai recidivējošiem monosimptomiem, 2) sensibilizētiem pacientiem, kuriem ir kontrindikācijas <i>Interferonum beta</i> terapijai, 3) pacientiem, kuriem jāpārtrauc <i>Interferonum beta</i> preparātu lietošana nepanesības vai neitralizējošo antivielu kritiska pieauguma dēļ.

1	2	3	4	5	6
				Mitoxantronum	Izraksta LJMC Multiplās sklerozes centra neirologi saskaņā ar Latvijas Neirologu biedrības Demielinizējošo slimību paneļa konsīlija slēdzienu pacientiem: 1) ar agresīvi noritošu recidivējoši-remitējošu multiplo sklerozi cerebrālu vai cerebrospinālu formu ar biežiem klīniskiem recidīviem un izteikti aktivizētiem imūnsistēmas rādītājiem, 2) ar sekundāri progresējošu multiplo sklerozi ar/bez recidīviem ar progresējošu invaliditātes attīstību un ilgstoši aktivētiem imūnsistēmas rādītājiem, 3) ar progresējošu aktīvo perēkļu skaita un lieluma palielinājumu MR attēlos.
			50	Inkontinences līdzekļi	Līdz 3 gab. dienā
14.3. Epizodiski un paroksizmāli traucējumi					
3.	Epilepsija	G40.0- G40.8	100	Ac. valproicum Ac.valproicum/ Natrii valproatum Clonazepamum Diazepamum Carbamazepinum	
				Gabapentinum Lamotriginum Oxcarbazepinum Topiramatum	Tikai pret <i>Ac.valproicum</i> un <i>Carbamazepinum</i> rezistentas epilepsijas gadījumā.
4.	Cerebrāla transitoriska išēmiska lēkme un radniecīgi sindromi	G45.0-G45.4 G45.8 G45.9	75	Betahistinum Warfarinum	Pirmajā gadā pēc cerebrālas transitoras išēmiskas lēkmes.
				Clopidogrelum	Tikai pacientiem ar smadzeņu asinsvadu aterotrombotisku bojājumu, apstiprinātu ar Dopplero- Duplex metodi un/vai angiogrāfiju, ja ir kontraindicēta <i>Ac.acetylsalicylicum</i> lietošana. Ārstēšanas kurss līdz 6 mēnešiem.
				Atorvastatinum Pravastatinum Rosuvastatinum Simvastatinum	Neirologa kompetencē. Tikai pacientiem ar aterotrombotisku smadzeņu asinsvadu bojājumu, pierādītu ar Dopplero- Duplex metodi un/vai angiogrāfiju, kuriem kopējais holesterīns ir lielāks par 4,5 mmol/l vai zema blīvuma lipoproteīnu holesterīns ir lielāks par 2,5 mmol/l.

1	2	3	4	5	6
14.4 Neiromuskulārās sinapses un muskuļu slimības					
5.	Myasthenia gravis un citas mioneirālas patoloģijas	G70.0-G70.2 G70.8	90	Azathioprinum Dexamethasonum Ipidacrinum Methylprednisolonum	8 injekcijas gadā.
				Nandrolonum Prednisolonum Pyridostigmini bromidum Spironolactonum	
6.	Iedzimas miopātijas	G71.2	90	Ipidacrinum	8 injekcijas gadā.
				Nandrolonum	
14.5. Cerebrālā trieka un citi paralītiski sindromi					
7.	Bērnu cerebrālā trieka	G80.0-G80.4 G80.8	100	Baclofenum Piracetamum Tolperisonum	Līdz 3 gab. dienā.
			50	Inkontinences līdzekļi	
14.6. Centrālās nervu sistēmas primāras sistēmiskas atrofijas					
8.	Hantingtona horeja	G10	75	Alprazolamum Diazepamum Haloperidolum Trihexyphenidylum	
9.	Pārmantota ataksija	G11.0-G11.4 G11.8 G11.9	75	Amantadinum Pyridostigmini bromidum	
10.	Motoriskā neirona slimības	G12.2	75	Nandrolonum	8 injekcijas gadā.
14.7. Ekstrapiramidāli kustību traucējumi					
11.	Distonija	G24.0-G24.5 G24.8 G24.9	75	Baclofenum Carbamazepinum Diazepamum Haloperidolum Tolperisonum Trihexyphenidylum	
14.9. Nervu, nervu saknīšu un pinumu patoloģija					
12.	Trijzaru nerva (n.trigeminus) patoloģija	G50.0 G50.1 G50.8 G50.9	50	Carbamazepinum	Neirologa vai algologa kompetencē.
				Gabapentinum	Neirologa vai algologa kompetencē. Neefektīvas terapijas gadījumā ar <i>Carbamazepinum</i> vai nepanesības dēļ.
				Baclofenum	Neirologa vai algologa kompetencē. Papildus terapijai pacientiem ar sāpju tiku.
13.	Neiraļģiska amiotrofija Ekstremitātes fantoma sindroms ar sāpēm Kauzaļģija	G54.5	50	Amitriptylinum	Neirologa vai algologa kompetencē.
		G54.6	50	Clomipraminum Tramadolum	
		G56.4	50		

1	2	3	4	5	6
				Carbamazepinum Gabapentinum	Neirologa vai algologa kompetencē. Pacientiem ar 1) šaujošām paroksismālām sāpēm, 2) kardiovaskulārām slimībām, 3) neefektīvas terapijas gadījumā ar tricikliskajiem antidepresantiem.
14.10. Polineiropātijas un citas perifēriskās nervu sistēmas slimības					
14.	Pārmantota un idiopātiska neiropātija	G60.0- G60.3 G60.8 G60.9	75	Ipidacrinum Pyridostigmini bromidum	
15.	Iekaisīga polineiropātija	G61.0 G61.1 G61.8 G61.9	75	Ipidacrinum Pyridostigmini bromidum Prednisolonum	
16.	Citas muguras smadzeņu slimības	G95.0- G95.2 G95.8 G95.9	50	Baclofenum Diclofenacum Oxybutyninum Pyridostigmini bromidum Tizanidinum Tolperisonum	
				Amitriptylinum Clomipraminum Tramadolum	Tikai G95.0- neirologa vai algologa kompetencē.
				Gabapentinum Carbamazepinum	Tikai G95.0- neirologa vai algologa kompetencē. Pacientiem ar 1) šaujošām paroksismālām sāpēm, 2) kardiovaskulārām slimībām, 3) neefektīvas terapijas gadījumā ar tricikliskajiem antidepresantiem.
			50	Inkontinences līdzekļi	Līdz 3 gab. dienā

Zāļu cenu valsts aģentūras direktore

D. Behmane